

Aprile 2024

RAZZA CABANNINA

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono frutto della raccolta di informazioni sulle caratterizzazioni fenotipiche effettuate durante l'intera durata del Progetto DualBreeding Fase 1 e sua successiva Fase 2, ancora in fase di svolgimento.

La presente statistica si basa su 120 osservazioni delle quali 66 sono state rilevate durante la Fase1 del Progetto DualBreeding.

Tabella 1. Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri distribuzione del mantello, colore del mantello e portamento delle corna

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	0	0	Intero	19	15.8	Assenti	5	4.2
Grigio	1	0.8	Pezzato	2	1.7	Portate in alto	67	55.8
Nero	1	0.8	Spruzzato	1	0.8	Portate in avanti	40	33.3
Bruno Chiaro	11	9.2	Striscia Dorsale	98	81.7	Rivolte in basso	4	3.3
Bruno Scuro	1	0.8				Decornato	4	3.3
Castano	106	88.3						
Fromentino	0	0						
Rosso	0	0						
Rosso Mogano	0	0						

Tabella 2. Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica

	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	120	124.0	4.5	113	134
Profondità addominale (cm)	120	68.0	6.0	57	88
Lunghezza tronco (cm)	120	86.0	6.8	70	102
Lunghezza groppa (cm)	120	45.2	2.4	40	56
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	120	43.9	2.7	38	50
Larghezza groppa bisischiatica (cm)	120	21.7	3.3	15	31
Inclinazione groppa (punteggio)	120	4.4	1.0	3	7
Prof. mammaria (cm)	120	10.7	7.2	-10	32
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	120	6.8	2.0	3	12
BCS (punteggio)	120	3.3	0.7	2	5
Muscolosità anteriore (punteggio)	120	5.3	1.2	3	8
Muscolosità Posteriore (punteggio)	120	5.5	1.4	2	9

Aprile 2024

Tabella 3. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la struttura degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	101	84.2	17	14.2	2	1.6
Dorso Arcuato	116	96.7	4	3.3	0	0.0
Spalle Deboli	93	77.5	23	19.2	4	3.3
Garretti serrati posteriormente	56	46.7	59	49.2	5	4.2
Unghia aperta	119	99.2	1	0.8	0	0.0

Tabella 4. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la mammella degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	92	76.7	22	18.3	6	5.0
Capezzoli non perpendicolari	103	85.8	17	14.2	0	0.0
Capezzoli soprannumerari	96	80.0	23	19.2	1	0.8
Mammella spaccata tra i quarti	95	79.2	23	19.2	2	1.7
Piano inclinato	76	63.3	36	30.0	8	6.7

Tabella 5. Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso i conspecifici, l'uomo e in mungitura

	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
Verso gli altri animali	72	60.0	43	35.8	5	4.2
Durante la mungitura	79	65.8	38	31.7	3	2.5
Verso l'uomo	78	65.0	38	31.7	4	3.3